

# ИНСТРУКЦИЯ

## ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

### Присыпка детская

**Регистрационный номер:**

**Торговое наименование:** Присыпка детская

**Международное непатентованное или группировочное наименование:** цинка оксид

**Лекарственная форма:** порошок для наружного применения.

**Состав на 100 г:**

*Действующее вещество:* цинка оксид – 10 г.;

*Вспомогательные вещества:* крахмал картофельный, тальк.

**Описание:** Белый или серовато-белый, мягкий, жирный на ощупь порошок. При растирании между ладонями не должно ощущаться крупинок, комочков.

**Фармакотерапевтическая группа:** дерматопротекторное средство.

**Код АТХ:** D08A

### Фармакологические свойства

Присыпка детская оказывает адсорбирующее, подсушивающее и вяжущее действие. Уменьшает экссудацию и мокнутие, снимает и предупреждает раздражение и воспаление кожных покровов.

### Показания к применению

«Пеленочная сыпь», дерматиты.

### Противопоказания

Повышенная чувствительность к цинка оксиду и компонентам препарата. Острые гнойно-воспалительные заболевания. Не наносить на раневую поверхность.

### Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Возможно применение при беременности и в период грудного вскармливания. Перед применением если Вы беременны, или предполагаете, что Вы могли бы быть беременной, или планируете беременность, в период грудного вскармливания необходимо проконсультироваться с врачом.

### Способ применения и дозы

Препарат применяется наружно в виде присыпки. Для профилактики опрелостей у детей присыпку детскую наносят на участки тела, находящиеся в длительном контакте с мокрым бельем. При дерматитах присыпку наносят тонким слоем на пораженные участки кожи.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

#### **Побочное действие**

При повышенной чувствительности к препарату возможны зуд, гиперемия, сыпь.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

#### **Передозировка**

Не выявлено.

#### **Взаимодействие с другими лекарственными препаратами**

Не выявлено.

#### **Особые указания**

Не допускать попадания в глаза. Следует избегать прямого или продолжительного вдыхания препарата. Сообщалось о случаях повреждения легких (в том числе серьезных) при непреднамеренном вдыхании большого количества порошка детских присыпок и других содержащих тальк средств или их длительном ингаляционном воздействии. При попадании большого количества препарата в дыхательные пути взрослого или ребенка следует обратиться к врачу.

#### **Форма выпуска**

Порошок для наружного применения.

По 40 г и 50 г в банки из полиэтилена высокого и низкого давления с крышками из полиэтилена.

Текст инструкции по применению наносится на этикетку банки.

#### **Условия хранения**

При температуре не выше 25 °С.

Хранить в местах, недоступных для детей.

#### **Срок годности**

5 лет.

Не применять по истечении срока годности.

#### **Условия отпуска**

Отпускают без рецепта.

**Владелец регистрационного удостоверения / Производитель / Организация, принимающая претензии потребителей**

Открытое акционерное общество «Акционерное Курганское общество медицинских пре-  
паратов и изделий «Синтез» (ОАО «Синтез»), Россия,

640008, Курганская обл.,

г. Курган, проспект Конституции, д. 7.

Телефон: 8-800-600-00-80

e-mail: [contact@ksintez.ru](mailto:contact@ksintez.ru)

[www.ksintez.ru](http://www.ksintez.ru)

Директор по регуляторике и исследованиям

Г.У. Сетдекова