

Новобисмол®

Висмута трикалия дицитрат

ЖЕЛУДОК

ГАСТРИТ



Рег. Уд. ЛП-001879

НЕ ОБОСТРЯЙ ОТНОШЕНИЯ С ЯЗВОЙ И ГАСТРИТОМ

Способ применения¹

Принимать за 30 минут до еды

Взрослым и детям старше 12 лет:

1 таб. 3 раза/сут. и 1 таб. на ночь
или по 2 таб. 2 раза/сут.

Детям в возрасте от 8 до 12 лет:

1 таб. 2 раза/сут.

Детям в возрасте от 4 до 8 лет:

8 мг/кг/сут.; суточную дозу разделяют
на 2 приема.

Таблетки необходимо запивать небольшим количеством воды. Продолжительность курса лечения 4-8 недель.

В течение следующих 8 недель не следует применять препараты, содержащие висмут.

Срок годности: 4 года

Условия отпуска: отпускают без рецепта

www.novobismol.ru

1. Инструкция по медицинскому применению НОВОБИСМОЛ РУ № ЛП-001879 F-M-NOVO-2021_12-418

Binnopharm
group

МОЖНО ПОРЕКОМЕНДОВАТЬ НОВОБИСМОЛ® В СЛЕДУЮЩИХ СИТУАЦИЯХ



ПАЦИЕНТАМ С ЖАЛОБАМИ на боль и/или жжение в подложечной области, чувство переполнения в эпигастрии после еды и/или раннее насыщение в период обострения хронического гастрита или язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

Новобисмол® бережно обволакивает стенки желудка, способствуя их заживлению и устранению симптомов. Входит в стандарты лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки¹.



В РАМКАХ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ для комплексной терапии кислотозависимых заболеваний и восстановления слизистой желудка, к следующим группам препаратов:

- ИПП: омепразол, рабепразол и т.д.
- Блокаторы H₂-гистаминовых рецепторов: ранитидин, фамотидин.
- Антациды: алгелдрат, магния гидроксид, кальция карбонат и пр.



С ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИКИ лекарственных поражений желудка в результате длительного применения НПВП: ибупрофен, диклофенак, нимесулид и др.

Новобисмол® НОВОБИСМОЛ формирует защитный слой, который помогает защитить слизистую оболочку желудка от агрессивных факторов². Рекомендован в комплексе с ингибиторами протонной помпы с целью профилактики лекарственных поражений желудка^{3,4}.

1. Стандарты лечения язвенной болезни и гастрита (Маастрихт v)

2. Инструкция по медицинскому применению препарата Новобисмол, ЛП-001879-120718.

3. Маев И.В., Андреев Д.Н., Дичева Д.Т. Гастропатии, индуцированные нестероидными противовоспалительными средствами: патогенетически обусловленные подходы к профилактике и терапии. Фарматека 2016;2:49–54. 4. Вялов С.С. Восстановление слизистой желудочно-кишечного тракта или снижение кислотности желудка? – Приоритеты в лечении. Эффективная фармакотерапия 2016;1:1–9.