

**ИНСТРУКЦИЯ**  
**по применению лекарственного средства для потребителей**  
**(листок-вкладыш)**

**Гентамицин-АКОС** мазь для наружного применения 0,1 %

**Торговое название:** Гентамицин-АКОС

**Международное непатентованное название:** Гентамицин

**Лекарственная форма:** мазь для наружного применения

**Состав мази на 100 г**

*Действующее вещество:* гентамицина сульфат (в пересчете на гентамицин) – 0,1 г

*Вспомогательные вещества:* парафин нефтяной твердый – 5,0 г, вазелин медицинский – до 100 г.

**Описание:** мазь от белого до желтого цвета.

**Фармакотерапевтическая группа**

Антибиотик-аминогликозид.

**Показания к применению**

Бактериальные инфекции кожи и мягких тканей, вызванные чувствительной микрофлорой – пиодермия (в т.ч. гангренозная), поверхностный фолликулит, фурункулез, сикоз, паронихия.

Инфицированные: дерматиты (в т.ч. контактный, себорейный и экзематозный), язвы (в т.ч. варикозные), раны (в т.ч. хирургические, вялозаживающие), ожоги (в т.ч. растениями), укусы насекомых, абсцессы кожи и кисты, «вульгарные» угри; вторичное бактериальное инфицирование при грибковых и вирусных инфекциях кожи.

**Противопоказания**

Гиперчувствительность (в т.ч. к др. аминогликозидам в анамнезе).

**С осторожностью:**

При необходимости применения на обширных поверхностях кожи – неврит слухового нерва, миастения, паркинсонизм, ботулизм, почечная недостаточность (в т.ч. тяжелая хроническая почечная недостаточность с азотемией и уремией), период новорожденности, недоношенность детей, пожилой возраст, беременность, период лактации.

**Категория действия на плод. В**

**Взаимодействие с другими лекарственными препаратами**

Одновременно или сразу по окончании курса лечения Гентамицином (при применении на больших поверхностях и/или в течение длительного времени) не следует назначать противомикробные и другие препараты, оказывающие отонефротоксическое действие.

**Особые указания**

Лечение проводят под контролем антибиотикограммы препарата, поскольку при длительном применении возможно развитие резистентности. В подобных случаях необходимо отменить лечение и начать проведение соответствующей терапии.

При нанесении на большие поверхности кожи необходимо учитывать возможность резорбтивного действия, особенно у пациентов с хронической почечной недостаточностью.

Если в течение 1 нед отсутствует терапевтический эффект, следует проконсультироваться с врачом.

#### ***Беременность и лактация***

Применение при беременности и в период лактации – с осторожностью.

*Особенности влияния лекарственного средства на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами:*

Не описаны.

### **Способ применения и дозы**

#### **Наружно!**

Тонкий слой мази наносят на пораженный участок 3-4 раза в сутки. Курс лечения 7-14 дней. Длительность лечения устанавливается врачом. Мазь применяют для лечения инфекций сухой кожи (в т.ч. на фоне экземы или псориаза). При необходимости накладывают повязку.

### **Побочное действие**

Аллергические реакции: местные – кожная сыпь, зуд, гиперемия кожи, чувство жжения; редко генерализованные – лихорадка, ангионевротический отек, эозинофилия.

При всасывании с обширных поверхностей развитие системных эффектов.

### **Форма выпуска**

Мазь для наружного применения 0,1 %.

По 15 г в тубы алюминиевые.

Каждую тубу с инструкцией по применению помещают в пачку картонную.

### **Условия хранения**

При температуре от 8 °С до 15 °С.

Хранить в местах, недоступных для детей.

### **Срок хранения**

3 года.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

### **Условия отпуска**

Отпускается по рецепту.

### **Претензии от покупателей принимает предприятие-производитель:**

Открытое акционерное общество «Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий «Синтез» (ОАО «Синтез»)

Россия, 640008, г. Курган, пр. Конституции, 7,

Тел/факс: (3522) 48-16-89

E-mail: [real@kurgansintez.ru](mailto:real@kurgansintez.ru)

Интернет-сайт: [www.kurgansintez.ru](http://www.kurgansintez.ru)