

ИНСТРУКЦИЯ  
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА  
**Эритромицин**

**Регистрационный номер:** Р N002127/02

**Торговое наименование препарата:** Эритромицин

**Международное непатентованное наименование:** эритромицин

**Лекарственная форма:** мазь для наружного применения

**Состав на 1 г:**

*Действующее вещество:* эритромицин (в пересчете на действующее вещество) – 10 тыс.ЕД;

*Вспомогательные вещества:* ланолин (ланолин безводный), натрия дисульфит (натрия метабисульфит, натрия пиросульфит), вазелин.

**Описание.** Мазь от светло-желтого до коричнево-желтого цвета

**Фармакотерапевтическая группа:** антибиотик-макролид.

**Код АТХ:** [D10AF02].

**Фармакологическое действие**

Бактериостатический антибиотик из группы макролидов. При наружном применении оказывает антибактериальное и противоугревое действие. Обратимо связывается с 50S субъединицей рибосом, что нарушает образование пептидных связей между молекулами аминокислот и блокирует синтез белков микроорганизмов (не влияет на синтез нуклеиновых кислот). При применении в высоких дозах в зависимости от вида возбудителя может проявлять бактерицидное действие.

Спектр действия включает грамположительные (*Staphylococcus*, *Streptococcus* spp., *Bacillus anthracis*, *Corynebacterium diphtheriae*) и грамотрицательные (*Neisseria gonorrhoeae*, *Haemophilus influenzae*, *Bordetella pertussis*, *Brucella* spp., *Legionella* spp.) микроорганизмы, а также *Mycoplasma* spp., *Chlamydia* spp., *Treponema* spp., *Rickettsia* spp. К препарату устойчивы грамотрицательные палочки *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, а также *Shigella* spp., *Bacteroides fragilis*, *Enterobacter* spp. И др.

### **Показания к применению**

Инфекции кожи и мягких тканей (гнойничковые заболевания кожи, в т.ч. юношеские угри, инфицированные раны, пролежни, ожоги II - III ст., трофические язвы).

### **Противопоказания**

Индивидуальная повышенная чувствительность.

### **Способ применения и дозы**

Наружно: мазь наносят на пораженные участки кожи 2-3 раза в день, длительность лечения - 1,5-2 мес.

При гнойных заболеваниях кожи и мягких тканей мазь наносят на пораженный участок кожи тонким слоем 1-2 раза в день после удаления некротических масс и гноя, при ожогах - 2-3 раза в неделю. Длительность лечения зависит от формы и тяжести заболевания и составляет от нескольких дней до 2 недель.

### **Побочное действие**

Возможно развитие аллергических реакций и раздражающее действие (покраснение, зуд). При длительном применении может развиваться вторичная инфекция, вызванная устойчивыми к эритромицину микроорганизмами.

### **Передозировка**

Данные по передозировке препарата отсутствуют.

### **Взаимодействие с другими лекарственными препаратами**

Препарат несовместим с линкомицином, клиндамицином, хлорамфениколом (антагонизм).

Снижает бактерицидное действие бета-лактамовых антибиотиков (пенициллины, цефалоспорины, карбапенемы).

При одновременном применении лекарственных форм эритромицина для наружного применения с абразивными веществами, приводящими к чрезмерному раздражению кожи, а также с лекарственными средствами, вызывающими шелушение кожи, возможен кумулятивный раздражающий или высушивающий эффект.

### **Особые указания.**

До использования любого другого противоугревого лекарственного средства для наружного применения должно пройти не менее 1 ч.

Если в течение 3-4 нед состояние угревой сыпи не улучшается, следует проконсультироваться с врачом (для достижения полного терапевтического эффекта может потребоваться 2-3 мес).

При длительном применении возможно развитие суперинфекции.

### **Применение при беременности и в период грудного вскармливания**

Достаточного опыта по применению препарата при беременности и в период грудного вскармливания нет. Возможно применение препарата по назначению лечащего врача, если ожидаемый лечебный эффект превышает риск развития возможных побочных эффектов.

### **Влияние на способность управлять транспортными средствами и механизмами**

В период применения препарата возможно управление транспортными средствами, механизмами и выполнение других потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

### **Форма выпуска**

Мазь для наружного применения 10 тыс.ЕД/г

5 г, 10 г, 15 г в тубы алюминиевые или в тубы ламинатные.

Каждую тубу с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

**Срок годности.** 3 года. Не использовать по истечении срока годности.

### **Условия хранения**

При температуре не выше 25 °С.

Хранить в местах, недоступных для детей.

### **Условия отпуска**

Отпускают по рецепту.

**Юридическое лицо, на имя которого выдано регистрационное удостоверение/ Производитель/ Организация, принимающая претензии:**

Открытое акционерное общество «Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий «Синтез» (ОАО «Синтез»), Россия  
640008, Курганская обл., г. Курган, проспект Конституции, д. 7  
Тел./факс: (3522) 48-16-89  
e-mail: [real@kurgansintez.ru](mailto:real@kurgansintez.ru)  
[www.kurgansintez.ru](http://www.kurgansintez.ru)