

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ СУЛЬФАЦИЛ-НАТРИЯ SULFACYLUM NATRII

Торговое название препарата: Сульфацил-натрия

Действующее вещество (МНН): сульфацетамид

Лекарственная форма: капли глазные.

Состав:

на 1 мл содержит:

активное вещество: сульфацетамид натрий – 200 г;

вспомогательных веществ: натрия тиосульфат – 1,5 мг, 1 М раствор хлористоводородной кислоты – до pH от 7,7 до 8,7, вода для инъекций – до 1 мл.

Описание: прозрачная бесцветная или слегка окрашенная жидкость.

Фармакотерапевтическая группа: антибактериальное синтетическое средство - сульфаниламид.

Код АТХ: S01AB04

Фармакологические свойства

Противомикробное бактериостатическое средство, сульфаниламид. Механизм действия обусловлен конкурентным антагонизмом с парааминобензойной кислотой (ПАБК), угнетением дигидроптероатсинтетазы, нарушением синтеза тетрагидрофолиевой кислоты, необходимой для синтеза пуринов и пиримидинов.

Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных кокков, *Escherichia coli*, *Shigella* spp., *Vibrio cholerae*, *Clostridium perfringens*, *Bacillus anthracis*, *Corynebacterium diphtheriae*, *Yersinia pestis*, *Chlamydia* spp., *Actinomyces israelii*, *Toxoplasma gondii*.

Фармакокинетика

Проникает в ткани и жидкости глаза. Всасывается в системный кровоток через воспаленную конъюнктиву. При местном применении максимальная концентрация сульфаниламидов в роговице (около 3 мг/мл), влаге передней камеры (около 0,5 мг/мл) и радужке (около 0,1 мг/мл) достигается за первые 30 мин после аппликации. Некоторое количество (менее 0,5 мг/мл) сохраняется в тканях глазного яблока в течение 3-4 ч. При повреждении эпителия роговицы пенетрация сульфаниламидов усиливается.

Показания к применению

Конъюнктивит, блефарит, гнойная язва роговицы, профилактика и лечение бленнореи у новорожденных, гонорейные и хламидийные заболевания глаз у взрослых.

Способ применения и дозы

Местно, закапывают по 1-2 капли в каждый конъюнктивальный мешок 4-6 раз в сутки. Для профилактики бленнореи у новорожденных - по 2 капли в каждый конъюнктивальный мешок непосредственно после рождения и по 2 капли - через 2 ч.

Побочные действия

Жжение, слезотечение, резь, зуд в глазах, аллергические реакции.

Противопоказания

Гиперчувствительность.

Лекарственные взаимодействия

Совместное применение с прокаинам и тетракаином снижает бактериостатический эффект. Несовместим с солями серебра.

Особые указания

Пациенты, обладающие повышенной чувствительностью к фуросемиду, тиазидным диуретикам, сульфонилмочевине или ингибиторам карбоангидразы могут иметь повышенную чувствительность к сульфацетамиду.

Применение при беременности и в период лактации

Возможно применение сульфацетамида для лечения беременных и кормящих матерей по назначению лечащего врача, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск развития для плода и ребенка.

Форма выпуска

Капли глазные 20%.

По 5 мл или 10 мл во флаконах-капельницах полимерных.

Каждый флакон с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

По 50 флаконов помещают в коробки из картона с приложением 5 инструкций по медицинскому применению для поставки в стационары.

Условия хранения

В защищенном от света месте, при температуре от 15 до 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года. После вскрытия флакона использовать в течение 1 месяца.

Препарат не следует применять после истечения срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Производитель/Организация, принимающая претензии

Открытое акционерное общество «Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий «Синтез» (ОАО «Синтез»).

640008, Россия, г. Курган, пр. Конституции, 7

Тел./факс: (3522) 48-16-89

e.mail: real@kurgansintez.ru

Интернет-сайт: <http://www.kurgansintez.ru>

Наименование и адрес организации принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств

ИП ООО «АТМ SANITA PHARMA»

Республика Узбекистан, г. Ташкент, Бектемирский район, ул. Олтинтопган, 40.

www.sanita.uz