

**Листок-вкладыш – информация для пациента**  
**ЛАРИНГОВАКТ, 20 мг + 10 мг, таблетки для рассасывания**

Действующие вещества: лизоцим + пиридоксин

**Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.**

- Всегда принимайте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.
- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если состояние не улучшается или оно ухудшается, Вам следует обратиться к врачу.

**Содержание листка-вкладыша**

1. Что из себя представляет препарат ЛАРИНГОВАКТ, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед приемом препарата ЛАРИНГОВАКТ.
3. Прием препарата ЛАРИНГОВАКТ.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата ЛАРИНГОВАКТ.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

**1. Что из себя представляет препарат ЛАРИНГОВАКТ, и для чего его применяют**

Препарат ЛАРИНГОВАКТ содержит действующие вещества лизоцим + пиридоксин и относится к антисептическим лекарственным средствам.

**Показания к применению**

Препарат показан к применению у взрослых и детей от 3 до 18 лет по показаниям: лечение инфекционно-воспалительных заболеваний слизистой оболочки полости рта, десен и гортани: гингивит, стоматит, катаральные явления в верхних отделах дыхательных путей, афтозные изъязвления, герпетические поражения (в составе комплексной терапии), эрозии слизистой оболочки полости рта любой этиологии.

## **Способ действия препарата ЛАРИНГОБАКТ**

ЛАРИНГОБАКТ – комбинированный препарат, действие которого обусловлено входящими в его состав компонентами.

Лизоцим является ферментом белковой природы, применяется как антисептик вследствие его прямого воздействия на бактерии, а также грибы и вирусы, принимает участие в регуляции местного неспецифического иммунитета.

Пиридоксин оказывает защитное действие на слизистую оболочку полости рта.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

## **2. О чем следует знать перед приемом препарата ЛАРИНГОБАКТ**

### **Противопоказания**

#### **Не принимайте препарат ЛАРИНГОБАКТ:**

- если у Вас аллергия на лизоцим, пиридоксин или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);
- если у Вас аллергия к куриному белку.

### **Особые указания и меры предосторожности**

Перед приемом препарата ЛАРИНГОБАКТ проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

В случае появления аллергических реакций прекратите применение препарата и обратитесь к врачу.

### **Дети и подростки**

Препарат ЛАРИНГОБАКТ не предназначен для применения у детей от 0 до 3 лет.

### **Другие препараты и препарат ЛАРИНГОБАКТ**

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Препарат ЛАРИНГОБАКТ усиливает действие антибиотиков, в том числе пенициллина, хлорамфеникола, нитрофурантоина, усиливает действие диуретиков, ослабляет активность леводопы. Изониазид, пеницилламин, пипразинамид, иммуносупрессоры, эстрогены и пероральные контрацептивы могут усиливать потребность в пиридоксине.

### **Беременность и грудное вскармливание**

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Препарат ЛАРИНГОВАКТ может применяться в период беременности и грудного вскармливания.

### **Управление транспортными средствами и работа с механизмами**

Препарат не влияет на способность управлять транспортом или заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторной реакции.

### **Препарат ЛАРИНГОВАКТ содержит сорбитол**

Если у Вас непереносимость некоторых сахаров, обратитесь к лечащему врачу перед приемом данного лекарственного препарата.

## **3. Прием препарата ЛАРИНГОВАКТ**

Всегда принимайте данный препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

### **Рекомендуемая доза**

#### Взрослые

По 2 таблетки 3–4 раза в сутки.

#### Применение у детей

Детям в возрасте 3–7 лет обычно назначают по 1 таблетке 3 раза в сутки, 7–12 лет – по 1 таблетке 4 раза в сутки.

Дети в возрасте от 12 до 18 лет: режим дозирования соответствует режиму дозирования у взрослых.

### **Путь и (или) способ введения**

Препарат применяется местно. Таблетки следует медленно рассасывать, не разжевывая, задерживая растаявшую массу таблетки в полости рта как можно дольше, до полного растворения.

### **Продолжительность терапии**

Курс лечения 8 дней.

### **Если Вы приняли препарата ЛАРИНГОВАКТ больше, чем следовало**

Симптомы передозировки маловероятны, могут отмечаться после применения в дозах, значительно превышающих терапевтические, и проявляются чувством онемения, ощущением покалывания, а также потерей чувствительности в области верхних и нижних конечностей.

Лечение: обильное питье.

### **Если Вы забыли принять препарат ЛАРИНГОВАКТ**

Если Вы пропустили дозу, примите препарат сразу, как вспомните об этом. Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу. Не превышайте максимальную суточную дозу.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

## **4. Возможные нежелательные реакции**

Подобно всем лекарственным препаратам препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

**При возникновении следующих серьезных нежелательных реакций сразу прекратите прием препарата и немедленно обратитесь к врачу:**

- отек лица (губы, веки, щеки) и слизистой рта, может распространяться на гортань, вызывая затруднение дыхания, охриплость голоса и лающий кашель (ангионевротический отек);
- затруднение дыхания, свистящие хрипы, удушье (бронхоспазм);
- зуд, покраснение кожи с появлением пузырей и волдырей (крапивница);
- сыпь на коже в виде круглых кольцевидных пятен с фиолетовой центральной частью и розовым венчиком, с локализацией на туловище и конечностях, в том числе на ладонях и стопах, на слизистой полости рта (мультиформная экссудативная эритема).

### Сообщение о подозреваемых нежелательных реакциях

Если у вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Российская Федерация

Адрес: 109012, Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)

Телефон: +7 800 550 99 03

Факс: +7 800 550 99 03

Электронная почта: [pharm@roszdravnadzor.gov.ru](mailto:pharm@roszdravnadzor.gov.ru)

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

<https://www.roszdravnadzor.gov.ru>

## **5. Хранение препарата ЛАРИНГОВАКТ**

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его.

Не принимайте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на картонной пачке после «Годен до:...».

Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Хранить препарат при температуре не выше 25 °С.

Не выбрасывайте препарат в канализацию.

Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожить) препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

## **6. Содержимое упаковки и прочие сведения**

### **Препарат ЛАРИНГОВАКТ содержит**

Действующими веществами являются лизоцим + пиридоксин.

Каждая таблетка содержит 20 мг лизоцима (в виде гидрохлорида) и 10 мг пиридоксина (в виде гидрохлорида).

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: маннитол, сорбитол, магния стеарат.

### **Внешний вид препарата ЛАРИНГОВАКТ и содержимое упаковки**

Таблетки для рассасывания.

Круглые двояковыпуклые таблетки белого или почти белого цвета.

По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной.

По 1, 2 или 3 контурных ячейковых упаковки вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

### **Держатель регистрационного удостоверения и производитель**

Российская Федерация

Акционерное общество «АЛИУМ» (АО «АЛИУМ»)

*Юридический адрес:* 142279, Московская обл., г. Серпухов, п. Оболенск, тер. Квартал А, д. 2

*Адрес производственной площадки:* 142279, Московская обл., г.о. Серпухов, п. Оболенск, тер. Квартал А, д. 2

*Выпускающий контроль:* 142279, Московская обл., г.о. Серпухов, п. Оболенск, тер. Квартал А, д. 2, стр. 1

Телефон: +7 (495) 646-28-68

Факс: +7 (495) 646-28-68

Адрес электронной почты: [info@binnopharmgroup.ru](mailto:info@binnopharmgroup.ru)

**За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий следует обращаться к держателю регистрационного удостоверения:**

Российская Федерация

Акционерное общество «АЛИУМ» (АО «АЛИУМ»)

*Юридический адрес:* 142279, Московская обл., г. Серпухов, п. Оболенск, тер. Квартал А, д. 2

Телефон: +7 (495) 646-28-68

Адрес электронной почты: [info@binnopharmgroup.ru](mailto:info@binnopharmgroup.ru)

**Листок-вкладыш пересмотрен**

**Прочие источники информации**

Подробные сведения о данном препарате содержатся на веб-сайте Союза:  
<http://eec.eaeunion.org/>.