

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

**ХОНДРОГЛЮКСИД**

**Регистрационный номер:** ЛП-000043

**Торговое наименование:** Хондроглюксид

**Международное непатентованное или группировочное наименование:**  
Глюкозамин + Хондроитина сульфат&

**Лекарственная форма:** гель для наружного применения

**Состав:**

*Активные вещества:* хондроитина сульфат натрия - 5,0 г, глюкозамина сульфата натрия хлорид (в пересчёте на глюкозамина сульфат) - 2,5 г.

*Вспомогательные вещества:* натрия дисульфит (натрия метабисульфит) - 0,05 г, этанол 96 % (спирт этиловый ректификованный 96 %) - 25,0 г, пропиленгликоль - 10,0 г, карбомер (карбопол) - 3,0 г, метилпарагидроксибензоат (нипагин, метилпарабен) - 0,2 г, лаванды масло - 0,05 г, вода очищенная - до 100 г.

**Описание:**

Бесцветный или с желтоватым оттенком гель со специфическим запахом.

**Фармакотерапевтическая группа:** репарации тканей стимулятор

**Код АТХ:** [M02AX10]

**Фармакологическое действие**

Стимулирует регенерацию хрящевой ткани, оказывает противовоспалительное и обезболивающее действие. Глюкозамин и хондроитина сульфат принимают участие в синтезе соединительной ткани, способствуя предотвращению процессов разрушения хряща и стимулируя регенерацию ткани.

Глюкозамин обладает хондропротекторными свойствами, принимает участие в биосинтезе протеогликанов и гиалуроновой кислоты. Глюкозамин селективно действует на суставной хрящ, является специфическим субстратом и стимулятором синтеза гиалуроновой кислоты и протеогликанов, угнетает образование перекисных радикалов и ферментов, повреждающих хрящевую ткань (коллагеназы и фосфолипазы).

Хондроитина сульфат стимулирует образование компонентов суставных хрящей,

синтез протеогликанов и коллагена II типа, а также защищают гиалурон от ферментативного расщепления (путем подавления активности гиалуронидазы) и от повреждающего действия свободных радикалов. Хондроитина сульфат поддерживает вязкость синовиальной жидкости, стимулирует механизмы репарации хряща и подавляет активность тех ферментов (эластаза, гиалуронидаза), которые расщепляют хрящ. Хондроитина сульфат при лечении остеоартроза облегчает симптомы этого заболевания и уменьшает потребность в нестероидных противовоспалительных препаратах (НПВП).

### **Показания к применению**

Остеоартроз (в том числе суставов и позвоночника I–III ст.).

### **Противопоказания**

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, повреждение целостности кожных покровов в месте нанесения препарата, детский возраст до 18 лет, беременность, период грудного вскармливания.

### **Применение при беременности и в период грудного вскармливания**

Не рекомендуется применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания, в связи с отсутствием данных о безопасности применения препарата у данной категории пациентов.

### **Способ применения и дозы**

Наружно. Гель наносят 2–3 раза в сутки тонким слоем полоской 4 см (2 г) на неповрежденную кожу над участком поражения, затем втирают до впитывания в течение 2–3 мин. Длительность применения препарата – 1 мес. Возможно проведение повторного курса по рекомендации врача.

### **Побочное действие**

Аллергические реакции.

Если Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

### **Передозировка**

Данные отсутствуют.

### **Взаимодействие с другими лекарственными препаратами**

Данные отсутствуют.

### **Особые указания**

Только для наружного применения. Препарат следует наносить только на неповрежденные участки кожи, избегая попадания на открытые раны, в глаза и на слизистые оболочки.

**Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами**

Применение препарата не влияет на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление автотранспортом, работа с движущимися механизмами).

**Форма выпуска**

Гель для наружного применения 5,0 г + 2,5 г.

По 30 г, 50 г, 100 г в тубы алюминиевые.

По 30 г, 50 г, 100 г в тубы ламинатные с навинченными полимерными бушонами.

Каждая туба с инструкцией по медицинскому применению в пачке из картона.

**Срок годности**

3 года.

Не использовать препарат после истечения срока годности.

**Условия хранения**

В защищённом от света месте при температуре не выше 25 °С. Не замораживать.

Хранить в местах, недоступных для детей.

**Условия отпуска**

Отпускают без рецепта

**Владелец регистрационного удостоверения / Производитель / Организация, принимающая претензии:**

Открытое акционерное общество «Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий «Синтез» (ОАО «Синтез»)

640008, Россия, г. Курган, проспект Конституции, 7,

Телефон/факс (3522) 48-16-89,

e-mail ontir@kurgansintez.ru,

Интернет-сайт предприятия: <http://www.kurgansintez.ru>